

Bilaga A

ACR:s reviderade klassifikationskriterier för systemisk lupus erytematosus från 1982 (minst 4 kriterier krävs för diagnos)

Kriterier	Definition
1. Fjärilsexantem	Fixerat utslag (platta eller upphöjda) över kinder som tenderar att skona nasolabiala fåror
2. Diskoida utslag	Erytematöst upphöjda fläckar med vidhäftande keratos och follikulär pluggning; atrofisk ärrbildning kan förekomma vid äldre lesioner
3. Fotosensitivitet	Hudutslag på grund av ovanlig reaktion på solljus, genom patientens historia eller läkares observation
4. Munsår	Orala eller nasofaryngeala sår, oftast smärtfria, vilka observerats av läkare
5. Artrit	Icke erosiv artrit som involverar två eller flera perifera leder och som kännetecknas av ömhet, svullnad eller utgjutning
6. Serosit	a) Pleurit - övertygande historia av pleuritisk smärta eller gnidningsljud observerat vid auskultation av en läkare eller radiologiska tecken på pleural utgjutning <i>ELLER</i> b) Perikardit - dokumenterad genom EKG eller gnidningsljud eller tecken på perikardutgjutning
7. Njurinflammation	a) Ihållande proteinuri mer än 0.5 gram per dag eller mer än 3+ om kvantifiering inte utförts <i>ELLER</i> b) Avvikande urinsediment – kan vara hematuri, erythrocytocyndrar, fin- eller grovkorniga cylindrar eller en blandning
8. Neuropsykiatrisk sjukdom	a) Kramper - i avsaknad av kända läkemedel eller kända metabola rubbningar; till exempel uremi, ketoacidosis eller elektrolytrubbningar <i>ELLER</i> b) Psykos - i avsaknad av kända läkemedel eller kända metabola rubbningar, till exempel, uremi, ketoacidosis eller elektrolytrubbningar
9. Hematologisk sjukdom	a) Hemolytisk anemia – med retikulocytos <i>ELLER</i> b) Leukopeni – mindre än 4.000/mm ³ vid 2 eller fler tillfällen <i>ELLER</i> c) Lymfopeni – mindre än 1.500/mm ³ vid 2 eller fler tillfällen <i>ELLER</i> d) Trombocytopeni – mindre än 100.000/mm ³ i frånvaro av utlösande läkemedel
10. Immunologisk störning	a) Positiv LE cellspreparation <i>ELLER</i> b) Anti-DNA: antikroppar mot nativt DNA i abnormal titer <i>ELLER</i> c) Anti-Smith: förekomst av antikroppar mot Smith antigen <i>ELLER</i> d) Falskt positivt serologiskt test för syfilis i minst 6 månader och som bekräftats av Treponema pallidum immobilisering eller fluorescerande treponemal antikropps-absorptionstest
11. Antinukleära antikroppar	En onormal titer av antinukleära antikroppar mätt med immunofluorescens, eller en motsvarande metod, vid vilken punkt som helst i tiden och i frånvaro av läkemedel som är kända för att vara associerade med "droginducerad lupus"