

Bilaga C

SLICC-gruppens klassifikationskriterier för systemisk lupus erythematosus från 2012

Minst 4 kriterier (≥ 1 kliniskt och ≥ 1 immunologiskt kriterium) krävs för diagnos

ELLER

Biopsiverifierad SLE-nefrit i kombination med ANA och/eller anti-dsDNA antikroppar

Kliniska kriterier:

1. **Akut kutan lupus** (fjärilsexantem, bullös lupus, toxisk epidermal nekrolys, makulopapulös lupus, solutlöst dermatit *ELLER* subakut kutan lupus)
2. **Kronisk kutan lupus** (lokaliserad/generell DLE, hypertrofisk lupus, lupus pannikulit, mucosal lupus, LE tumidus, chillblains lupus, DLE/lichen planus overlap)
3. **Orala sår** (Gom, kind, tunga *ELLER* nasala sår)
4. **Icke ärr-bildande alopeci** (diffus tunt, fragilt hår med synliga brutna hårstrån)
5. **Synovit** (≥ 2 leder med svullnad/utgjutning *ELLER* ≥ 2 leder med ömhet och ≥ 30 min morgonstelhet)
6. **Serosit:** (bestående i mer än 1 dygn)
 - a) Pleurit (röntgen, UKG eller gnidningsljud)
 - b) Perikardit (UKG eller gnidningsljud)
7. **Nefrit** (24-h urin-albumin ≥ 0.5 g protein/24 h *ELLER* erytrocyt-cylindrar)
8. **Neurologisk påverkan:**
 - a) Kramper
 - b) Psykos
 - c) Mononeuritis multiplex
 - d) Myelit
 - e) Perifer/cranial neuropati
 - f) Akut konfusion)
9. **Hemolytisk anemi**
10. **Leukopeni** ($<4 \times 10^9$) *ELLER* **Lymfopeni** ($<1 \times 10^9$)
11. **Trombocytopeni** ($<100 \times 10^9$)

Immunologiska kriterier:

1. **ANA** i patologisk nivå enligt lokalt lab
2. **Anti-dsDNA** i patologisk nivå enligt lokalt lab (> 2 ggr nedre gräns om ELISA används)
3. **Anti-Smith** i patologisk nivå enligt lokalt lab
4. **Antifosfolipidantikroppar:**
 - a) Lupus antikoagulant
 - b) Falskt positivt test för syfilis (plasma reagin)
 - c) Medelhög till hög nivå anti-kardiolipin antikroppar (IgA, IgG, IgM)
 - d) Positivt test för anti- β_2 -glykoprotein I antikroppar (IgA, IgG, IgM)
5. **Lågt komplement** (C3, C4, CH50)
6. **Positivt direkt Coombs' test** (i frånvaro av hemolytisk anemi)