

ACR/EULARs definition av remission vid reumatoid artrit vid kliniska prövningar, uppdaterad 2022

I. Boolean (2.0)-baserad definition

Vid någon tidpunkt måste patienten uppfylla samtliga av följande:

Ömma leder ≤ 1 †

Svullna leder ≤ 1 †

CRP ≤ 1 mg / dl

Patientens globala bedömning ≤ 2 (på en skala från 0-10) ‡

II. Indexbaserade definition

Vid någon tidpunkt måste patienten ha SDAI $\leq 3,3$ §

† Vid användning av 28-leders index kan aktiva leder missas (framför allt i fötter och fotleder) och det är att föredra att även inkludera fötter och fotleder vid utvärdering av remission.

‡ För bedömning av remission föreslås följande format och formulering för de globala skattningarna.

Format: en horisontell 10-cm visuell analog eller Likertskala med de bästa och lägsta poängen på vänster sida och de sämsta och högsta poäng på höger sida.

Formuleringar av frågorna:

Patientens globala bedömning: "Med tanke på alla de sätt din ledgångsreumatism har påverkat dig, hur upplever du att din ledgångsreumatism är idag "(mycket bra- mycket dålig)?

Läkarens/bedömarens globala bedömning: "Vilken är din bedömning av patientens aktuella sjukdomsaktivitet"(Ingen aktivitet- maximalt aktiv)?

§ SDAI definieras som summan av antalet ömma leder (av 28 leder), svullna leder (av 28 leder), patientens globala bedömning (0-10 skala), läkarens globala bedömning (0-10 skala), och CRP (mg/dl).

Referens: (50, 473)